

診察室からII (39) 高尿酸血症

実は痛風発作を引き起こす高尿酸血症には3つのタイプがあるのです。

- ①尿酸が作られる量は正常なのですが、腎臓からの排泄が低下しているタイプで日本人の約60%がこのタイプです
- ②尿酸の排泄機能は正常なのに、作る量が多すぎるタイプで、全体の約20%です
- ③あとの約10%は混合型といって、尿酸排泄低下と産生過剰の両方が合併しているタイプです

高尿酸血症の治療薬も尿酸排泄低下を改善させるお薬と尿酸産生過剰を改善させるお薬の2タイプがあるので、高尿酸血症のタイプを知ることが非常に重要です。

タイプを知る検査法では尿酸クリアラン

ス検査というのがお勧めですが、朝に検査薬を服用して来院し、検査が終了するまで約2時間もかかってしまいます。それがいやな方は、簡便検査をおこないます。ただ、高尿酸血症に軽度でも腎機能障害を合併している方では、腎臓に優しい尿酸産生過剰改善薬があるので検査なしで投薬を開始することもあります。

また、尿が酸性に傾いていると、尿酸結石が形成されてしまうので、内服薬で尿をアルカリ化させる必要もあります。特に尿酸排泄改善薬を服用している場合は注意が必要です。


今回は風邪と肺炎のお話です。

杉田クリニック 杉田 隆彰




ISS(国際宇宙ステーション)を見よう！！ [2017年9月]

2017年8月26日作成(作成後に軌道変更されている場合は見られない場合があります)



25日(月)

- ①18時43分09秒
- ②18時48分34秒
- ③18時50分48秒



27日(水)

- ①18時34分18秒
- ②18時39分44秒
- ③18時43分35秒

日没後から0時までには仰角30度以上を通過するもののみ掲載

西2 瀬尾

※ 肉眼で見えます

□ から1字ずつパーツをえらび、組み合わせて9つの漢字をつくりましょう。パーツは全部使い、かつ1回ずつしか使えません。

里	日	心
尺	力	立
牛	王	早

竹	見	大
日	日	土
月	十	角

一	寸	木
一	月	口
刀	月	亡

□	□	□
□	□	□
□	□	□